

# Samenvatting van clindamycine op de huid

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clindamycine voor op de huid is een antibioticum. Het remt de groei van bacteriën.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- acne (puistjes en pukkels)
- hidradenitis (ontsteking van uw zweetklieren)
- eikelontsteking

Dit medicijn werkt binnen een paar dagen.

## Gebruik

Clindamycine voor op de huid is er als gel en lotion. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Gel met clindamycine

1. Breng de gel aan met uw vingertoppen. Let op dat u de gel niet inmasseert. Maak daarom 'kloppende' bewegingen.
2. Was uw handen.

### Lotion met clindamycine

1. Gebruik een watje om de lotion op uw huid aan te brengen.
2. Was uw handen.

**Let op!** Sommige lotions zijn brandbaar. Blijf daarom uit de buurt van open vuur zoals een sigaret.

### Gebruikt u dit medicijn bij acne?

1. Maak eerst uw huid schoon met lauw water en zeepvrije emulsie of gel.
2. Breng dit medicijn dan dun aan op de pukkels en op de plaatsen waar u vaak last heeft van mee-eters, pukkels en puisten.

### Gebruikt u dit medicijn bij een eikelontsteking?

1. Spoel vóór elke gebruik uw eikel en voorhuid af met water en dep het droog.
2. Smeer daarna de crème in een dunne laag op uw eikel en voorhuid.

**Let op!** Dit medicijn mag niet in uw ogen, neus, mond of op wondjes komen. Want dat gaat prikken en branden. Gebeurt dit toch? Spoel dan meteen met veel water.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Droge huid en irritatie van de huid. Dit komt vooral voor bij de lotion met clindamycine waar alcohol in zit. Gebruik daarom regelmatig een neutrale crème op de plekken waar u dit medicijn smeert. U kunt uw apotheker hiernaar vragen.
- Galbulten (jeukende zwellingen).

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

**Let op!** Smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Smeer het dan direct ná de borstvoeding op of rond uw tepel. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

