

Samenvatting van aripiprazol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Aripiprazol remt wanen en hallucinaties.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- psychoses en bij schizofrenie. U ziet en hoort dingen die er niet zijn.
- manie. U heeft dan te veel energie, heeft weinig slaap nodig en bent veel blij.
- onrust
- erge depressie

De tabletten en drank beginnen te werken binnen een paar uur. Ze werken ongeveer 1 dag lang.

Bij schizofrenie of ernstige onrust gebruikt u dit medicijn meestal meerdere jaren.

Bij manie of bij psychoses door depressie gebruikt u dit medicijn meestal tijdens de manische of psychotische periode.

Gebruik

Aripiprazol is er als tabletten, drank en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met aripiprazol

Slik de tabletten met een half glas water of met een andere drank.

Drank met aripiprazol

1. schud de drank.
2. Gebruik het bijgeleverde maatbekertje of druppelpipetje om de juiste hoeveelheid af te meten.
3. Drink die hoeveelheid op.

Injecties met aripiprazol

U krijgt de injectie van de arts of verpleegkundige. U kunt de injectie krijgen in een bilspier of schouderpier. Meestal is dat 1 keer per maand.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- problemen met bewegen. Zoals spiertrekkingen, stijve spieren en niet stil kunnen zitten. Heeft u hier last van? Raadpleeg dan uw arts.
- rusteloos gevoel
- suf, slaperig of duizelig gevoel
- wazig zien
- hoofdpijn
- seksuele problemen. Zoals moeilijker een erectie kunnen krijgen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Rijd de **eerste 2 weken geen auto** als u start met dit medicijn of als uw dosering omhoog gaat. U mag ook **niet** rijden als u de injecties samen met de tabletten of drank krijgt. Rijd geen auto als u last heeft van wazig zien of een suf, slaperig of duizelig gevoel.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn komt in de moedermelk en kan slecht zijn voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

