

Samenvatting van azitromycine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Azitromycine remt de groei van bacteriën (antibioticum).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- infecties van luchtwegen, huid, middenoor of geslachtsorganen
- de ziekte van Lyme
- reizigersdiarree

Azitromycine werkt binnen een paar dagen.

Gebruik

Azitromycine is er als tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met azitromycine

Neem de tabletten met een half glas water.

Drank met azitromycine

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een doseerspuit of maatlepel.
3. De drank smaakt bitter. Drink daarom daarna een glas water of vruchtensap tegen de bittere smaak. Een kuur duurt meestal 1 tot 5 dagen. Bij sommige ziektes duurt de kuur langer.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn en buikpijn
Heeft u hier last van? Neem het dan samen met eten.
- diarree en winderigheid
- hoofdpijn
- duizelig zijn
- minder goed proeven
- tintelend gevoel in handen of voeten
- niet kunnen slapen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.s.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af.

Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

