

Samenvatting van **betahistine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Betahistine kan zorgen dat het bloed in uw binnenoor beter stroomt. In uw binnenoor zit het evenwichtsorgaan.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de **ziekte van Menière**. U heeft hierbij aanvallen van flinke duizeligheid met oorsuizen en gehoorverlies. Het is niet bewezen dat dit medicijn bij de ziekte van Menière werkt.

U kunt na een paar weken beoordelen of dit medicijn helpt tegen uw klachten. Zijn uw klachten na een paar weken niet minder geworden? Overleg dan met uw arts.

Gebruik

Betahistine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
 - misselijk voelen
 - maagklachten, zoals buikpijn
- Krijgt u last van uw maag of wordt u misselijk? Neem de tablet dan met wat voedsel. Dan heeft u er minder last van.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

