

# Samenvatting van ceftriaxon

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ceftriaxon doodt bacteriën (antibioticum)

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties met bacteriën. Zoals:

- geslachtsziekten zoals gonorroe en syfilis
- hersenvliesontsteking
- longontsteking
- middenoorontsteking
- blaasontsteking
- huidinfectie
- sepsis
- ziekte van Lyme (tekenbeetziekte)
- infecties van maag en darmen

Ceftriaxon werkt binnen een paar dagen.

## Gebruik

Ceftriaxon is er als infuus en als injectie.

U krijgt ceftriaxon in het ziekenhuis van uw arts of verpleegkundige. Het infuus duurt 30 minuten. De injectie krijgt u in een ader of in uw (bil)spier.

Ceftriaxon is een kuur. U krijgt het dus een aantal keer. Vaak krijgt u dit medicijn een paar dagen tot 2 weken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- diarree,
- misselijk zijn
- overgeven

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Krijgt u last van 1 van de volgende bijwerkingen? Ga dan meteen naar uw arts.

- blauwe plekken
- keelpijn met koorts en blaren
- heel erg vermoeid zijn
- bloedneus

**Let op!** U kunt **allergisch** zijn voor dit medicijn. Let op of u erge klachten krijgt, zoals:

- huiduitslag
- benauwd zijn
- koorts
- flauwvallen

Stop dan met dit medicijn en bel **meteen** uw arts.

Bent u allergisch voor ceftriaxon? Meld dit dan bij uw apotheek.

## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

**Let op!** Heeft u gonorroe of syfilis?

U kunt nog andere mensen besmetten. Ook als u geen klachten heeft. Zorg daarom dat u geen seks heeft als u besmet bent. U kunt **1 week na de behandeling** weer seks hebben. Gebruik een condoom en doe eerst een soa-test.