

# Samenvatting van celecoxib

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Celecoxib werkt tegen pijn, ontstekingen en verlaagt koorts.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- gewrichtspijn
- reumatoïde artritis (reuma)
- de ziekte van Bechterew
- artrose (versleten gewrichten)
- menstruatiepijn (pijn door ongesteld zijn)

De pijn wordt na 1 tot 2 uur minder. Dit medicijn werkt 12 tot 24 uur tegen pijn.

Ontstekingen worden binnen 1 tot 2 weken minder rood en dik.

## Gebruik

Celecoxib is er als capsule.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de capsule met een half glas water.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maag- en darmklachten. Zoals buikpijn, misselijk zijn, overgeven en maagzuur.
- zweren in uw maag en darmen
- bloedingen in uw maag en darmen

Heeft u last van maagklachten? Neem dit medicijn dan tijdens of na het eten. Dan heeft u minder kans op bijwerkingen.

Let op! U heeft een medicijn nodig om uw maag te beschermen als u:

- ouder dan 60 jaar bent
- eerder een maag- of darmzweer heeft gehad
- medicijnen tegen bloedstolling gebruikt

Vraag uw arts of apotheker om advies.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Celecoxib en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met celecoxib.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door alcohol heeft u meer kans op maagklachten.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.

U mag dit medicijn **niet** gebruiken bij pijn in de tweede helft van uw zwangerschap.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.