

# Samenvatting van cinnarizine met chloorcyclizine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Cinnarizine met chloorcyclizine zorgt dat u minder misselijk bent.

Cinnarizine met chloorcyclizine werkt bij reisziekte.

Het werkt na ongeveer een half uur en blijft 6 tot 8 uur lang werken.

## Gebruik

Cinnarizine en chloorcyclizine zijn er als tabletten. In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met wat voedsel. Doe dit een half uur voor u vertrekt. Na 8 uur kunt u het nog een keer nemen. Gebruik het maximaal 3 keer per dag.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf en slaperig zijn
- minder snel reageren. Daardoor kunt u eerder vallen.
- wazig zien
- droge mond

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** U mag **24 uur** niet autorijden nadat u dit medicijn heeft gebruikt.



**Let op** met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen of voor de baby in uw buik.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen en kan bijwerkingen geven bij de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

