

# Samenvatting van dapagliflozine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Dapagliflozine verlaagt uw bloedsuiker.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij **diabetes mellitus** (suikerziekte). Door dit medicijn heeft u minder kans op schade door diabetes. Zoals wonden die slecht genezen, zenuwpijn, nierproblemen, hart- en vaatziekten en blind worden.

De klachten van diabetes zoals dorst, vaak plassen en een droge mond verdwijnen meestal binnen een paar dagen. Binnen een paar weken bent u minder moe.

Uw arts schrijft dit medicijn ook voor bij **hartfalen** en **schade aan de nieren die niet meer beter wordt** (chronische nierschade). Dit medicijn beschermt uw hart tegen het erger worden van hartfalen en zorgt ervoor dat uw nieren niet slechter gaan werken.

## Gebruik

Dapagliflozine is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water. U gebruikt dit medicijn **elke dag**.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van **te weinig suiker in het bloed (hypo)**. Dit gebeurt vaker als u dapagliflozine samen gebruikt met insuline of andere medicijnen die de bloedsuiker verlagen.

Een hypo merkt u aan honger, wazig zien, hoofdpijn, moe voelen, duizelig zijn, een bleek gezicht, trillen, zweten, hartkloppingen en een wisselend humeur. Eet of drink bij een hypo snel iets met suiker, of druivensuiker.

Andere bijwerkingen van dit medicijn zijn:

- Vaker en meer moeten plassen
- Duizelig voelen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt. **Let op!** Door een hypo kunt u een ongeluk krijgen.

**Wat moet u doen als u wilt autorijden?**

- Rijd alleen als u zich goed voelt.
- Meet voor het rijden uw bloedsuiker.
- Rijd alleen als u weet dat u een hypo kunt voelen aankomen.
- Overleg met uw arts of u veilig kunt autorijden.



**Let op!** Door alcohol kunt u een hypo krijgen. En uw lichaam voelt minder snel een hypo aankomen. Drink liever geen alcohol. Of drink minder dan 2 glazen per dag.



**Let op! Niet** gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.