

Samenvatting van dexamethason

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Dexamethason is een bijnierschorsormoon (corticosteroid). Het remt ontstekingen en overgevoeligheidsreacties.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- kanker
- COVID-19 (corona)
- bloedziektes
- ontstekingen van de luchtwegen, de huid en gewrichten
- ernstige allergische reacties
- hoogteziekte
- hersenvliesontsteking
- bijnierziekten

Het werkt binnen een paar uur.

Gebruik

Dexamethason is er als tabletten, capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u mag gebruiken.

Tabletten en capsules met dexamethason

Slik de tabletten of capsules met een half glas water.

Drank met dexamethason

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbeker of maatpipet.
3. Drink die hoeveelheid op.

Dexamethason wordt vaak gebruikt als een **stootkuur**. U krijgt dan een paar dagen een hoge dosering dexamethason.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten van de maag en darmen.
- hoofdpijn
- spierpijn
- veranderingen in emoties, zoals bang zijn of depressie
- vocht in uw benen of handen
- infecties

Gebruikt u vaker per jaar een stootkuur? Of gebruikt u dit medicijn langer dan een paar weken? U kunt zwaarder worden en een bol gezicht krijgen. Ook kunt u huidklachten zoals blauwe plekken en broze botten krijgen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Dexamethason en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met dexamethason.



Let op! Gebruikt u dit medicijn langer dan 3 weken en wilt u stoppen? Stop dan niet in 1 keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: hoofdpijn, trillen, hartkloppingen en een misselijk gevoel. Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? En gaat u dit medicijn langer dan een paar weken gebruiken? Geef dan **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Gaat u dit medicijn kort gebruiken? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.