

# Samenvatting van diclofenac

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Diclofenac werkt bij:

- pijn, zoals van de schouder of gewrichten
- ontsteking van gewrichten (zoals reuma en jicht)
- menstruatieklachten
- griep en koorts
- migraine en hoofdpijn

Pijn wordt vaak minder na 1 tot 2 uur.

De rode huid en zwelling door de ontsteking worden na ongeveer 1 week minder.

## Gebruik

Diclofenac is er als tabletten en zetabletten.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiters staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met diclofenac

Slik de tabletten met een half glas water. U kunt de tabletten het beste op een lege maag slikken.

**Let op!** Er zijn gewone tabletten en tabletten met een speciaal laagje. Op die tabletten staat *maagsapersistent, retard, MGA of MVA*. Deze tabletten mag u **niet** fijnmaken of kauwen. Anders kunt u maagklachten krijgen of werken de tabletten te kort.

Gewone tabletten en maagsapresistente tabletten werken 6 uur. Langwerkende tabletten (retard, MGA, MVA) werken 12-24 uur.

### Zetabletten met diclofenac

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat). De zetpil werkt na ongeveer 30 minuten.

Uitleg van de apotheeker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van klachten van de maag. Zoals buikpijn, misselijk zijn, overgeven, brandend maagzuur, diarree, verstopping, winderigheid of boeren.

Gebruikt u tabletten en heeft u last van deze bijwerkingen? Neem ze dan samen met eten. Dan heeft uw maag er minder last van.

**Let op!** U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
- Heeft u **eerder** maagzweren of darmzweren gehad?

Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheeker.

## Waarschuwingen



**Let op!** Diclofenac en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheeker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken samen met diclofenac.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op** met alcohol. Alcohol geeft meer kans op maagklachten.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw apotheeker of arts of u diclofenac mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag diclofenac in ieder geval **NIET** gebruiken bij pijn in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.