

Samenvatting van doxycycline

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Doxycycline doodt bacteriën (antibioticum).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties. Zoals:

- infecties van luchtwegen, huid, darmen of geslachtsorganen
- de ziekte van Lyme
- malaria
- Q-koorts

Doxycycline werkt binnen een paar dagen.

Gebruik

Doxycycline is er als tabletten, capsules, oplostabletten ('disper') en als injecties.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten en capsules met doxycycline

1. Sta rechtop of zit rechtop. Anders raakt uw slokdarm beschadigd.
2. Slik de tabletten of capsules met een glas water.

Let op! De capsules **niet** nemen met voedsel, melk of andere melkproducten. Want dan werken ze minder goed.

Oplostabletten met doxycycline

1. Sta rechtop of zit rechtop. Anders raakt uw slokdarm beschadigd.
2. Los de oplostabletten op in een glas water. Drink op.
3. Drink daarna nog een half glas water.

Injecties met doxycycline

U krijgt de injectie van de arts of verpleegkundige.

Een kuur duurt meestal 1 tot 3 weken. Bij sommige ziektes kan de kuur maanden tot jaren duren.

Gebruikt u doxycycline om malaria te voorkomen? Gebruik het dan nog 4 weken nadat u weg bent uit het malariagebied.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk worden.
U heeft hier minder last van als u de tabletten met wat voedsel neemt. De capsules mag u niet met voedsel innemen.
- schimmelinfectie van mond, keel, vagina of anus (poepgat).

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën.



Let op! Blijf uit de felle zon en ga niet onder de zonnebank. Dit medicijn maakt uw huid gevoeliger voor UV-licht. Daardoor kunt u eerder verbranden door de zon.



Let op! Doxycycline en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met doxycycline.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken vanaf **week 16** van de zwangerschap. Dit medicijn is slecht voor de botten en tanden van de baby. Vraag uw arts om advies.



Let op! Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Gebruik dit medicijn **niet langer dan 3 weken** als u borstvoeding geeft. Moet u dit medicijn langer dan 3 weken gebruiken? Overleg dan met uw arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Apotheek.nl