

# Samenvatting van flecaïnide

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Flecaïnide maakt uw hartslag langzamer en zorgt dat uw hart regelmatig klopt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren
- om hartritmestoornissen te voorkomen

Binnen een paar uren worden uw hartkloppingen minder.

## Gebruik

Flecaïnide is er als tabletten, capsules en injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en capsules.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met flecaïnide

Slik de tablet met een half glas water.

### Capsules met flecaïnide

- Slik de capsule heel door. **Kauw niet** op de capsule.
- Heeft u moeite met slikken? U mag de capsule ook openen en de korrels doorslikken met een half glas water. **Kauw niet** op de korrels.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- licht gevoel in het hoofd of duizelig zijn
- wazig of dubbel zien

Meestal verdwijnen deze klachten binnen een aantal weken. Blijft u hiervan last houden? Overleg dan met uw arts.

Soms wordt een hartritmestoornis erger. Uw arts controleert u hierop. Merkt u dat uw hartklachten erger worden? Waarschuw dan uw arts

## Waarschuwingen



Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u flecaïnide veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u flecaïnide mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Gebruik flecaïnide in ieder geval **NIET** tijdens de **eerste 6 maanden** van de zwangerschap.



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

