

Samenvatting van flurbiprofen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Flurbiprofen vermindert pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts.

U gebruikt flurbiprofen bij keelpijn.

De verzachtende werking begint na ongeveer 2 minuten. Na ongeveer 2 uur wordt de keelpijn minder. Dit medicijn werkt 3,5 tot 4 uur lang.

Gebruik

Flurbiprofen is er als zuigtablet en keelspray.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Let op! Neem dit medicijn **niet vaker dan 5 keer per dag**.

Zuigtablet: langzaam in de mond laten smelten of erop zuigen. Beweeg de zuigtablet tijdens het zuigen altijd door de mond.

Keelspray: richt het mondstuk van de spray naar de achterkant van uw keel. Spray 3 keer.

Hoelang?

Gebruik dit medicijn niet langer dan 3 dagen. Blijft u keelpijn houden? Raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Maag- en darmklachten. Zoals misselijk zijn, buikpijn, brandend maagzuur en diarree.
Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen. Heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad? Dan heeft u misschien een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheker.
- hoofdpijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door alcohol heeft u meer kans op maagklachten.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. U mag flurbiprofen in ieder geval **NIET** gebruiken in de tweede helft van de zwangerschap (vanaf 20 weken).



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

