

Samenvatting van hydrocortison, oxytetracycline en polymyxine B in het oor

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxytetracycline en polymyxine B doden bacteriën (antibiotica). Hydrocortison is een bijnierschorshormoon en remt ontstekingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij een ontsteking van de gehoorgang.

Dit medicijn werkt binnen een paar dagen.

Gebruik

Hydrocortison, oxytetracycline en polymyxine B in het oor is er als oordruppels en oorzalf. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Oordruppels

Bij gebruik zonder gaasje of oortampon:

1. Maak het druppelflesje even warm in uw handen.
2. Schud het flesje een paar keer om.
3. Houd uw hoofd opzij.
4. Trek uw oor naar boven en naar achteren.
5. Laat de druppels vallen in de gehoorgang of op het gaasje in uw oor.
6. Houd uw hoofd nog 3 minuten schuin of ga op uw zij liggen.

Bij gebruik met gaasje of oortampon:

(uw arts heeft een opgerold gaasje of oortampon natgemaakt met de oordruppeloplossing en in uw oor gedaan)

1. Houd het gaasje of de oortampon vochtig door regelmatig met de oordruppels te druppelen.
2. De arts adviseert u meestal het gaasje of de oortampon na 1 tot 2 dagen te verwisselen.

Oorzalf

1. Houd uw hoofd opzij.
2. Trek uw oor naar boven en naar achteren.
3. Laat een sliert zalf van ongeveer 1 cm in uw oor vallen. Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag. Dan werkt dit medicijn het beste.

Heeft u 's ochtends bij het wakker worden geen loopoor meer? Gebruik het medicijn dan nog wel dezelfde dag, maar stop er daarna mee.

Let op! Gebruik deze oordruppels of oorzalf niet langer dan 2 weken. Anders kan het trommelvlies kapotgaan.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Een pijnlijk of brandend gevoel meteen na het druppelen. Dit verdwijnt snel. Blijft u hier last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
- Dunner worden van uw trommelvlies. Hierdoor kan het trommelvlies kapotgaan. Gebruik dit medicijn daarom niet langer dan 2 weken.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

