

# Samenvatting van hydroxychloroquine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Hydroxychloroquine remt ontstekingen. Het doodt ook bepaalde bacteriën en parasieten.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- reumatoïde artritis (reuma),
- lupus erythematoses (LE). Dat is een ziekte uw afweer uw eigen lichaam ziek maakt. Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld in uw gewrichten.
- overgevoeligheid van uw huid voor licht
- Q-koorts
- malaria en om malaria te voorkomen.
- lichen planus (ontstekingen op de huid of slijmvliezen).

Meestal merkt u binnen een paar weken dat uw ziekte rustiger wordt.

## Gebruik

Hydroxychloroquine is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water. Slik hydroxychloroquine **tijdens of na het eten**. Dan wordt u minder snel misselijk.

## Hoelang?

- LE en reuma: u gebruikt dit medicijn meestal langdurig.
- Lichtovergevoeligheid: gebruik dit medicijn alleen tijdens zonnige tijden. Bijvoorbeeld in de zomer.
- Q-koorts: u gebruikt dit medicijn 1,5 tot 4 jaar.
- Voorkomen van malaria: begin met dit medicijn 1 week voordat u in het malariagebied aankomt. Neem het daarna 1 keer per week zolang u in het malariagebied bent. Doe dit steeds op dezelfde dag van de week. Na vertrek uit het malariagebied blijft u het nog 4-8 weken gebruiken.
- Behandelen van malaria: soms gebruikt u dit medicijn 1 keer. En soms gebruikt u dit medicijn 3 dagen lang. Gebruikt u dit medicijn 3 dagen? Neem dan op de eerste dag dit medicijn 2 keer in, met een tussenpoos van 6 tot 8 uur. Op dag 2 en 3 neemt u dit medicijn 1 keer in.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- minder eetlust
- misselijk zijn, diarree en buikpijn
- huiduitslag

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

**Let op!** Krijgt u last van oorsuizen, problemen met zien, hartkloppingen, geelzucht of koorts? Waarschuw dan meteen uw arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

