

Samenvatting van **ibuprofen**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ibuprofen werkt bij pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts.

Ibuprofen werkt bij:

- pijn en ontsteking van gewrichten. Zoals: jicht, reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew
- pijn door artrose (dunner kraakbeen in gewrichten)
- hoofdpijn en migraine
- menstratieklachten
- spierpijn
- griep en verkoudheid

Ibuprofen werkt na 30 tot 60 minuten. Het werkt 8 uur lang.

Zetpillen en tabletten met vertraagde afgifte werken na 2-3 uur. Ze werken ongeveer 12 uur lang.

Gebruik

Ibuprofen is er als tabletten, capsules, dragees, poeder voor een oplossing, als drank en als zetpillen.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoe en hoeveel u moet gebruiken. **Let op!** Neem dit medicijn **niet vaker dan 4 keer per dag**.


Hoelang?

Gebruikt u dit medicijn tegen koorts? Neem het dan niet langer dan 3 dagen.

Gebruikt u het tegen pijn? Neem het dan niet langer dan 5 dagen.

Blijft u klachten houden? Overleg dan met uw arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maag- en darmklachten. Zoals misselijk zijn, buikpijn, brandend maagzuur en verstopping.
- hoofdpijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Gebruikt u dit medicijn lang achter elkaar tegen hoofdpijn? Dan kan dit de hoofdpijn juist erger maken.

Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar?**
- Gebruikt u **bloedverdunners?**
- Heeft u **eerder** maagzweren of darmzweren gehad?

Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen



Let op! Ibuprofen en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Overleg dan met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met ibuprofen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Door alcohol te drinken krijgt u meer kans op klachten van de maag.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag ibuprofen in ieder geval **NIET** gebruiken bij pijn in tweede helft van uw zwangerschap



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.