

# Samenvatting van Lidocaïne met prilocaïne op de huid

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lidocaïne met prilocaïne verdooft uw huid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- tegen pijn, zoals bij kleine huidoperaties, het inbrengen van een naald en wondverzorging van een open been
- bij vroegtijdige zaadlozing (te vroeg klaarkomen)

Het werkt binnen een paar uur.

## Gebruik

Lidocaïne met prilocaïne op de huid is er als crème en pleisters. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Crème met lidocaïne en prilocaïne:

Bij pijn:

1. Knijp de crème uit de tube op de huid die u wilt verdoven.
2. Dek de crème af met de afdekkfolie. U mag de crème **niet** inwrijven.
3. Was uw handen.

Bij vroegtijdige zaadlozing:

1. Smeer de crème op uw penis.  
U kunt hiervoor een vingercondoom (dit is een hoesje voor over de vinger) gebruiken. Dit kunt u kopen bij de apotheek.
2. Laat de crème 5 tot 10 minuten zitten
3. Haal de crème daarna weg. Doe dit **voor** u gaat vrijen.

### Pleister met lidocaïne en prilocaïne:

Plak de pleister op de huid. Zorg dat deze huid droog en schoon is. Laat de pleister tussen de 1 en 5 uur zitten.

**Let op!** Laat dit medicijn niet in uw ogen of in wonden komen.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een geïrriteerde rode huid met jeuk, tintelingen of een brandend gevoel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen

**Let op!** De crème beschadigt het rubber van condooms en vrouwencondooms. Hierdoor kunnen ze makkelijker scheuren.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

