

Samenvatting van **liraglutide**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Liraglutide verlaagt het bloedsuiker.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en overgewicht.

De klachten van diabetes zoals dorst, vaak plassen en een droge mond verdwijnen meestal binnen een paar dagen. Binnen een paar weken bent u minder moe.

Door dit medicijn heeft u minder kans op schade door diabetes. Zoals wonden die slecht genezen, zenuwpijn, nierproblemen, hart- en vaatziekten en blind worden.

Gebruik

Liraglutide is er als injecties.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag.
Spuut dit medicijn in uw bovenbeen, buik of bovenarm.

Uw arts of diabetesverpleegkundige legt u graag uit hoe u moet spuiten, en hoe u kunt meten hoeveel suiker er in uw bloed zit. U kunt ook de instructievideo van bloedsuiker meten bekijken op [Apotheek.nl](https://www.apotheek.nl).



Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van **te weinig suiker in het bloed (hypo)**. Dit merkt u aan honger, hoofdpijn, moe voelen, duizelig zijn, een bleek gezicht, trillen, zweten, hartkloppingen en flauwvallen. Eet of drink bij een hypo snel iets met suiker, of druivensuiker.

Andere bijwerkingen van dit medicijn zijn:

- Misselijk zijn
- Diarree
- Hoofdpijn en vermoeid zijn
- Verkoudheidsklachten. Zoals een verstopte neus.
- Irritatie op de plek waar u dit medicijn spuit

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Door een hypo kunt u een ongeluk krijgen. Wat moet u doen als u wilt autorijden?

- Rijd alleen als u zich goed voelt.
- Meet voor het rijden uw bloedsuiker.
- Rijd alleen als u weet dat u een hypo kunt voelen aankomen.
- Overleg met uw arts of u veilig kunt autorijden.



Let op! Door alcohol kunt u een hypo krijgen. En uw lichaam voelt minder snel een hypo aankomen. Drink liever geen alcohol. Of drink minder dan 2 glazen per dag.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.