

Samenvatting van lormetazepam

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lormetazepam maakt u slaperig.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij problemen met slapen.

U wordt binnen 15 tot 30 minuten slaperig. Dit medicijn werkt langer dan 10 uur.

Gebruik

Lormetazepam is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Let op! Dit medicijn werkt het best als u het af en toe gebruikt. Gebruik lormetazepam daarom bijvoorbeeld niet vaker dan **1 keer in de 3 dagen**.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of moe worden. Dit kan tot de volgende dag duren.
- minder snel reageren en moeite met bewegen. Daardoor kunt u eerder vallen. Dit kan tot de volgende dag duren.
- hoofdpijn en een duizelig gevoel
- slappe spieren
- geheugenproblemen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u dit medicijn elke dag? Dan werkt dit medicijn minder goed. En het kan moeilijk worden om met dit medicijn te stoppen. Gebruikt u het langer dan 2 weken achter elkaar? Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts



Let op! Gebruikt u **elke dag meer dan 1 mg**? Dan mag u niet autorijden.

Gebruikt u **af en toe 1 mg of minder** per keer? Dan mag u steeds 10 uur niet autorijden nadat u lormetazepam heeft gebruikt.

Gebruikt u **af en toe meer dan 1 mg**? Dan mag u steeds **24 uur** niet autorijden nadat u lormetazepam heeft gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.