

# Samenvatting van metamizol

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metamizol zorgt voor minder pijn, spierkrampen en ontstekingen en het verlaagt koorts.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij koorts en **hevige pijn**, zoals pijn na een operatie, pijnaanval door niersteen (nierstenkoliek) en pijn bij kanker en bij migraine.

De pijn wordt minder binnen 30 minuten. Dit medicijn werkt ongeveer 4 uur tegen pijn.

De koorts wordt binnen 30 minuten tot 1 uur minder. Het blijft 4 tot 6 uur werken tegen koorts.

## Gebruik

Metamizol is er als tabletten en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met metamizol

- Slik de tablet heel door met een half glas water.
- **Let op!** Neem dit medicijn niet meer dan 4 keer op een dag. Zorg dat er tussen iedere inname minimaal 6 uur zit.

### Injecties met metamizol

U krijgt de injecties in het ziekenhuis van de arts of verpleegkundige.

**Let op!** Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 weken achter elkaar.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Een rode kleur van uw plas. Dit is onschuldig.
- Bloedingen. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige poep. Stop dan met dit medicijn en waarschuw meteen uw arts.
- Bij de injecties: huiduitslag, pijn en reacties op de injectieplaats.

**Let op!** U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverduunners**?
- Heeft u **eerder** een maagzweer of darmzweer gehad?

Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheker.

## Waarschuwingen



**Let op!** Metamizol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met metamizol.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor uw baby. U mag metamizol in ieder geval **NIET** gebruiken in de tweede helft van de zwangerschap (vanaf 20 weken).



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.