

# Samenvatting van metronidazol in de vagina

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metronidazol is een antibioticum. Het doodt sommige bacteriën en parasieten.

Uw arts schrijft vaginaalzetpillen (ovules) met metronidazol voor bij infecties van de vagina. Namelijk bij:

- trichomonas (een geslachtsziekte)
- bacteriële vaginose

U heeft binnen een paar dagen minder last van de klachten

## Gebruik

Metronidazol in de vagina is er als zetpillen (ovules). Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Ga op uw rug liggen. Buig uw benen een beetje en spreid ze.
2. Duw de zetpil diep in uw vagina.
3. Doe dit vlak voordat u gaat slapen. Dan kan de zetpil de hele nacht werken.

Een kuur met metronidazol duurt 7 tot 10 dagen


## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- pijn of irritatie in de vagina
- hoofdpijn
- misselijk of duizelig voelen
- metaalsmaak in de mond
- geen trek in eten hebben

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën of parasieten over.



**Let op!** Metronidazol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met metronidazol.

**Let op!** De ovule beschadigt het rubber van condooms en vrouwencondooms (pessaria). Hierdoor kunnen deze sneller scheuren. Dit duurt nog tot 3 dagen na uw kuur met metronidazol.

**Let op!** Het is beter om tijdens de behandeling **geen** seks te hebben. Dit medicijn werkt dan minder goed. Wilt u dit toch? Wacht dan minimaal 2 uur nadat u de ovule heeft ingebracht.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Drink **geen** alcohol als u dit medicijn gebruikt. Anders kunt u vervelende bijwerkingen krijgen. Zoals een rood gezicht, misselijk voelen of benauwd zijn. Wacht na het einde van de kuur nog **minimaal 2 dagen** voor u weer alcohol drinkt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. De melk kan wel een nare metaalsmaak krijgen.