

Samenvatting van miconazol op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Miconazol doodt schimmels, gisten en bepaalde bacteriën.

Miconazol op de huid werkt bij:

- huidinfecties met schimmel, zoals voetschimmel, schimmelnagels, eikelontsteking en pityriasis versicolor (een speciale gistinfectie)
- huidinfecties met bacteriën, zoals puistjes (acne)
- putjeszolen

Roodheid, jeuk en schilfers worden binnen 2 weken minder. U gebruikt dit medicijn meestal 2 tot 12 weken.

Gebruik

Miconazol op de huid is er als strooi-poeder, crème, zalf en tinctuur (nagellak).

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Voetschimmel

1. Was uw voeten en verwijder schilfers.
2. Smeer de crème of zalf in een dunne laag. Smeer 2 cm breder dan de ontstoken plek.
3. Strooi eventueel ook nog wat poeder in uw sokken en schoenen.

Huidinfecties

Smeer de crème of zalf in een dunne laag. Smeer 2 cm breder dan de ontstoken plek.

Schimmelnagels

1. Vóór elke toepassing goed schoonmaken.
2. U gebruikt hierbij de tinctuur (nagellak) of de crème.

Eikelontsteking

1. Spoel uw eikel en de voorhuid af met water en dep droog.
2. Smeer de crème in een dunne laag op uw eikel en voorhuid.

Puistjes (acne)

1. U gebruikt hiervoor de crème in combinatie met benzoylperoxide.
2. Maak de huid schoon met lauw water voordat u de crème aanbrengt.
3. Smeer de crème in een dunne laag op de aangedane plekken.

Putjeszolen

Smeer de crème op de plekkjes.

Bijwerkingen

U kunt wat last krijgen van een branderig gevoel op de huid of irritatie van de huid.

Deze bijwerkingen gaan snel over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog schimmels, gisten of bacteriën over. Is uw huid beter? Blijf miconazol nog 1 week smeren.

Let op! Gebruikt u dit medicijn voor eikelontsteking? Dit medicijn maakt het rubber van condooms kapot. Een condoom kan daardoor makkelijker scheuren. Gebruik een ander voorbehoedsmiddel.



Let op! Gebruik miconazol niet als u de bloedverdunders fenprocoumon of acenocoumarol gebruikt. Overleg met uw arts of apotheker.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. **Let op!** Smeert u miconazol op of rond de tepel? Maak voor de borstvoeding de tepel dan schoon met afgekoeld gekookt water.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

