

# Samenvatting van minipil met desogestrel

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

De minipil met desogestrel is een anticonceptiepil.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om zwangerschap te voorkomen.

## Gebruik

De minipil met desogestrel is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Gebruikt u de minipil voor het eerst? Begin dan op de eerste dag dat u ongesteld wordt. Dan werkt de pil meteen en bent u meteen beschermd tegen zwangerschap.
- Begint u niet op de eerste dag, maar een paar dagen later? De pil is dan pas na 7 dagen betrouwbaar. Gebruik daarom in de eerste week extra vorm van anticonceptie, bijvoorbeeld condooms.
- Gebruikte u eerst een andere anticonceptiepil of -methode? Meestal kunt u direct overstappen op deze pil. Vraag uw apotheek om uitleg.
- Neem altijd op dezelfde tijd van de dag in. Dus altijd 's avonds of altijd 's ochtends. U slikt deze pil aan een stuk door, dus zonder pauzedagen. U neemt het dus ook in tijdens uw menstruatie.
- **Let op!** Bent u een pil vergeten of heeft u binnen 4 uur na het slikken overgegeven of heeft u ernstige diarree? Misschien werkt de pil dan niet meer goed. Kijk in de bijsluiter wat u moet doen. Of vraag dit aan uw apotheek.

Uitleg van de apotheeker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- tussentijds bloedverlies
- wegblijven van de menstruatie
- zwaarder worden
- misselijk worden
- pijnlijke borsten
- hoofdpijn.

Meestal gaan deze bijwerkingen binnen 3 maanden vanzelf weg.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen of blijft u last houden? Overleg dan met uw apotheeker of arts.

## Waarschuwingen



De minipil met desogestrel en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Overleg met uw apotheeker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Bent u ondanks de minipil met desogestrel toch zwanger geworden? Stop dan met de minipil. Heeft u per ongeluk de eerste maanden van de zwangerschap de minipil gebruikt? Dit is niet slecht voor uw baby. Overleg hierover verder met uw apotheeker of arts.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Vanaf 3 weken na de bevalling kunt u de pil veilig gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. **Tot 3 weken na de bevalling** kunt u de pil beter **NIET** gebruiken.