

# Samenvatting van mirabegron

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mirabegron ontspant de spieren van uw blaas. Hierdoor past er meer urine (plas) in uw blaas. U hoeft dan minder vaak te plassen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij urine-incontinentie. U kunt dan uw plas niet goed ophouden, u heeft plotseling sterke aandrang om te plassen en u moet vaker dan normaal plassen.

Dit medicijn werkt binnen een paar uur.

Merkt u na 6 weken dat dit medicijn niet goed genoeg bij u werkt? Overleg dan met uw arts.

## Gebruik

Mirabegron is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet heel door met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn. U heeft hier minder last van als u dit medicijn met wat voedsel inneemt.
- blaasontsteking. Krijgt u last van pijn bij het plassen, buikpijn of koorts? Raadpleeg dan uw arts.
- hoge bloeddruk. Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig meten.
- snelle hartslag
- hoofdpijn, duizelig voelen
- verstopping of juist diarree

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

