

# Samenvatting van nortriptyline

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Nortriptyline zorgt ervoor dat u zich beter voelt bij een depressie. Het werkt ook tegen pijn.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij depressie
- bij pijn door schade aan zenuwen (zenuwpijn)
- bij maagklachten
- bij prikkelbare-darmsyndroom
- als hulpmiddel bij stoppen met roken

Gebruikt u dit medicijn tegen **depressie**?

U merkt niet direct dat u zich beter voelt. Dit duurt een paar weken.

Gebruikt u dit medicijn tegen **zenuwpijn**?

De pijn wordt na 1 week minder.

## Gebruik

Nortriptyline is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water. Doe dit het liefst in de ochtend.

Gebruikt u dit medicijn verdeeld over de dag? Neem dan de hoogste hoeveelheid in de ochtend.

Gebruikt u dit medicijn om te **stoppen met roken**?

Stop dan met roken in de tweede week dat u dit medicijn slikt.

Rookt u 7 weken nadat u bent gestart met dit medicijn nog steeds?

Neem dan contact op met uw arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- een droge mond
- verstopping in uw darmen
- misselijk voelen
- trillende handen
- zweten
- duizelig zijn
- wazig zien
- moe zijn
- moeite met concentreren
- in de war zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Nortriptyline en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met nortriptyline.



**Let op!** Gebruikt u nortriptyline al een paar weken en gaat u stoppen? Stop dan niet in 1 keer. Bouw het langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** Als u begint met dit medicijn, of als de hoeveelheid nortriptyline die u slikt hoger wordt, mag u in de eerste week geen autorijden. Daarna mag u alleen autorijden als u geen bijwerkingen heeft.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.