

Samenvatting van oxycodon

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxycodon is een **sterke pijnstiller**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- ernstige pijn. Zoals na operaties, na een ongeluk, of door kanker.
- pijn bij mensen die niet meer beter worden tijdens hun laatste levensfase.

Tabletten, capsules en drank met oxycodon werken binnen 1 uur. Het werkt 4 tot 6 uur lang. De tabletten met vertraagde afgifte werken 12 uur lang.

Gebruik

Oxycodon is er als tabletten, capsules, smelttabletten, drank en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten en capsules met oxycodon

Slik de tablet of de capsule met een half glas water.

Let op! Gebruikt u de tabletten met vertraagde afgifte? Hier komt oxycodon langzaam uit vrij. De tabletten **niet fijnmaken of kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Smelttabletten met oxycodon

1. Laat de tablet in uw mond smelten.
2. Slik de tablet door.

Drank met oxycodon

Meet de drank af met een druppelpipet, maatlepel, druppelaar, maatbekertje of doseerspuitje.

Gebruik oxycodon zolang u hevige pijn heeft. Doe dit volgens een vast schema.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- erge verstopping in uw darmen. Gebruik daarom elke dag een laxerend middel.
- andere klachten aan uw maag of darmen. Zoals: diarree, buikpijn en misselijk zijn
- suf, slaperig en duizelig zijn
- jeuk

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Als u oxycodon lang gebruikt, kunt u verslaafd raken. Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk.



Let op! Heeft u oxycodon lang gebruikt en wilt u stoppen? **Stop niet in één keer**. Anders kunt u last krijgen van klachten. Vraag uw apotheker of arts om advies.



Let op! Eet of drink bij dit medicijn niet te veel grapefruit. Door grapefruit kunt u meer kans op bijwerkingen krijgen.



Let op! U mag **niet** altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Dit komt doordat u suf en slaperig kan zijn. Hoelang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker of arts.n.



Let op! met alcohol als u oxycodon gebruikt. Alcohol kan u extra suf of slaperig maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik oxycodon **niét** vlak voor de bevalling



Let op! Geef geen borstvoeding als u oxycodon gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

