

Samenvatting van prednison

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Prednison remt ontstekingen en overgevoeligheidsreacties (corticosteroid).

Uw arts schrijft dit medicijn voor (bij):

- erge ontstekingen, zoals bij reuma en ontstekingen van de darmen, huid luchtwegen en ogen
- erge allergische reacties
- clusterhoofdpijn
- sommige bloedziektes
- de spierziekte van Duchenne
- gezichtsverlamming
- nierziekten
- netelroos
- na orgaantransplantaties
- sommige kankersoorten
- misselijk gevoel door chemotherapie
- bijnierziekten

Binnen een paar uren tot weken nadat u bent gestart met dit medicijn worden uw klachten minder. Hoe snel dit medicijn werkt hangt af van hoe lang u dit medicijn moet gebruiken.

Bijwerkingen

U kunt in het begin van de behandeling last krijgen van:

- klachten in de maag of darmen. Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan met wat eten.
- hoofdpijn
- spierpijn
- dikkere benen of handen door vocht vasthouden
- infecties

Gebruikt u dit medicijn langer dan een paar weken? Of gebruikt u dit medicijn vaker in een jaar als stootkuur?

Dan kunt u last krijgen van:

- zwaarder worden
- een bol gezicht
- huidklachten, als blauwe plekken
- botontkalking

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Prednison is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Prednison wordt ook gebruikt als **stootkuur**. Deze kuur duurt een paar dagen tot weken.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u dit medicijn **langer dan 3 weken**? Stop niet in één keer. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Prednison en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met prednison.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Een korte stootkuur met dit medicijn is veilig voor de baby. Gebruikt u **meer dan 10 mg prednison** op een dag **tijdens meerdere weken of langer**? Overleg met uw arts. Gebruikt u prednison om uw eigen bijnierschors hormoon aan te vullen (substitutie therapie)? Dat is veilig voor de baby.



Let op! Wilt u borstvoeding geven? Een stootkuur van een paar weken kunt u veilig gebruiken. Gaat u dit medicijn **langer dan een paar weken** gebruiken? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

