

Samenvatting van pregabaline

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Pregabaline brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- zenuwpijn
- angst
- hik, als deze niet over gaat
- rusteloze benen
- pijn na een operatie

Bij epilepsie merkt u na een paar weken dat het werkt. U krijgt minder of geen epileptische aanvallen. Zenuwpijn en angst kunnen binnen een week minder worden.

Gebruik

Pregabaline is er als capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Capsules met pregabaline

Slik de capsule heel door met een half glas water. Niet kauwen.

Drank met pregabaline

1. Meet de juiste hoeveelheid af met een doseerspuit.
2. Haal de spuit uit de fles terwijl deze rechtop staat.
3. Druk de spuit leeg in uw mond.
4. Spoel de spuit na met wat water.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- slaperig of moe zijn
- duizelig zijn
- in de war of vergeetachtig zijn
- moeite met concentreren
- wazig zien

Deze bijwerkingen zijn in het begin vaak het sterkst.

Verder kunt u last krijgen van:

- hoofdpijn
- maagdarmklachten
- een droge mond
- problemen met bewegen
- zwaarder worden in gewicht
- doof of tintelend gevoel in voeten of handen

U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage hoeveelheid begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U mag de eerste week niet autorijden. Nadat u 1 week lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Rijd dan alleen als u geen bijwerkingen heeft.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.