

# Samenvatting van proguanil met atovaquon

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Atovaquon en proguanil doden de malariaparasiet.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij malaria en om malaria te voorkomen.

## Gebruik

Atovaquon met proguanil is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water bij **een warme maaltijd** of met **een zuiveldrank**. Het medicijn wordt dan beter opgenomen en u wordt minder snel misselijk.

Neem dit medicijn steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip.

## Hoelang?

- **Voorkomen van malaria:** begin met dit medicijn 1 dag voordat u in het malariagebied aankomt. Neem het daarna 1 keer per dag zolang u in het malariagebied bent. Na vertrek uit het malariagebied blijft u het nog 7 dagen slikken.
- **Behandelen van malaria:** u gebruikt dit medicijn 3 dagen lang in een hoge dosis.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn, diarree en buikpijn
- hoofdpijn en duizeligheid
- minder eetlust
- slechter kunnen slapen
- klachten van depressie

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog parasieten over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

