

Samenvatting van risperidon

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Risperidon zorgt ervoor dat wanen, hallucinaties en tics minder worden.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- psychoses en schizofrenie (u ziet of hoort dingen die er niet zijn)
- dementie
- manie (u heeft dan te veel energie, heeft weinig slaap nodig en bent veel blij)
- onrust
- tics
- dwangstoornissen
- angst na een schokkende gebeurtenis (posttraumatische stressstoornis)

De tabletten en drank beginnen binnen een paar uur te werken. Daarna werkt het ongeveer een halve dag tot 1 dag.

Gebruikt u dit medicijn bij psychoses? Dan moet u het meestal een half jaar tot meerdere jaren gebruiken.

Gebruik

Risperidon is er als gewone tabletten, smelttabletten, drank en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gewone tabletten met risperidon

Slik de tablet met een half glas water.

Smelttabletten met risperidon

Laat de smelttabletten in uw mond smelten. Slik het daarna door.

Drank met risperidon

1. Meet de juiste hoeveelheid af met een doseerpipet, maatbeker of maatlepel.
2. Drink die hoeveelheid op. Neem de drank **niet** in met thee.

Injectie met risperidon

U krijgt de injectie van uw arts of verpleegkundige.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- seksuele problemen, zoals minder zin hebben om te vrijen
- hoofdpijn
- depressieve klachten
- waarder worden
- problemen met bewegen. Zoals trekkende spieren, stijve spieren en niet stil kunnen zitten.
- suf, slaperig of duizelig gevoel
- wazig zien

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met risperidon. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U kunt suf, slaperig en duizelig worden of wazig zien. **Rijd 3 weken geen auto** als u start met dit medicijn of als uw dosering omhoog gaat. U mag **niet autorijden** als u de injectie samen met de tabletten of drank krijgt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

