

# Samenvatting van rivastigmine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Rivastigmine zorgt dat de zenuwen in uw hersenen beter werken. Het maakt de zenuwen sterker. Hierdoor gaat het geheugen bij sommige mensen minder snel achteruit.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- dementie door de ziekte van Alzheimer of door de ziekte van Parkinson.
- klachten bij de ziekte van Parkinson, zoals psychotische klachten en apathie. U heeft dan nergens zin in en heeft minder emoties.

## Gebruik

Rivastigmine is er als capsules en pleisters.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Capsules met rivastigmine

1. Slik de capsule met een half glas water.
2. Neem het tijdens of net na het ontbijt en het avondeten. Dan heeft u minder kans om misselijk te worden.

### Pleisters met rivastigmine

1. Plak de pleister op een schone en droge plek op uw rug, bovenarm of borst.
2. Wissel de pleister elke dag op dezelfde tijd om met een nieuwe pleister.
3. Plak de nieuwe pleister steeds op een andere plek.
4. Wacht minimaal 2 weken voor u een plek opnieuw gebruikt.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn
- buikpijn
- diarree
- verlies van eetlust
- duizelig, slaperig en in de war zijn. Hierdoor reageert u minder snel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** U mag de eerste paar dagen **niet autorijden** als u met dit medicijn begint. Als u na een paar dagen gewend bent en uw arts toestemming heeft gegeven, kunt u eventueel weer autorijden.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

