

Samenvatting van Salicylzuur bij huidaandoeningen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Salicylzuur maakt de bovenste laag (hoornlaag) van de huid zacht. Daardoor laten schilfers makkelijker los.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidaandoeningen zoals:

- droge huid
- psoriasis
- eczeem

Het wordt ook samen met andere medicijnen gebruikt in huidmiddelen. Door salicylzuur dringen andere medicijnen dan beter door in uw huid.

U merkt binnen een paar dagen dat de schilfers minder worden. Bij psoriasis wordt dikke huidplekken dunner.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Jeuk of een geïrriteerde huid. Dit gaat binnen een paar minuten over.
- Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Salicylzuur bij huidaandoeningen is er als zalf en als gel. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Let op! Laat het medicijn niet in ogen, neus, mond, oorgleden of wondjes komen. Dit geeft sterke irritatie.

Let op! Gebruik de gel of zalf met salicylzuur niet vlak voor een UVB-behandeling (lichtbehandeling bij psoriasis). De UVB-behandeling werkt dan minder goed.

Zalf met salicylzuur

- De zalf in een dunne laag uitsmeren.
- Eventueel afdekken met een droog verband.
- Soms adviseert uw arts om de huid een paar dagen af te dekken met folie of tape. Hierdoor kan de salicylzuur beter inwerken op de hoornlaag van de huid.

Gel met salicylzuur

- Leg minimaal 5 minuten een natte omslag op het huidgedeelte dat u moet behandelen. Of leg het huidgedeelte ten minste 5 minuten in warm water.
- Droog de huid af.
- Dunne gedeelten van de huid, zoals de pols en de enkel, insmeren met zinkolie. Zo beschermt u deze dunne huidgedeelten.
- De gel inwrijven in het huidgedeelte dat u moet behandelen.
- Daarna afdekken met plastic folie.
- Was uw handen nadat u dit medicijn hebt gesmeerd.
- De volgende ochtend uw huid wassen.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? U mag dit medicijn maximaal 2 weken op kleine oppervlakken gebruiken. Wilt u dit medicijn langer gaan gebruiken? Of op meer plekken die groter zijn dan een handpalm? Overleg dan eerst met uw arts of apotheker.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. **Let op!** Gebruik dit medicijn alleen op kleine oppervlakken. En smeet het niet op de borst of rond de tepel.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

