

# Samenvatting van semaglutide

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Semaglutide verlaagt uw bloedsuiker. Uw arts schrijft dit medicijn voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en ernstig overgewicht.

De klachten van diabetes zoals dorst, vaak plassen en een droge mond verdwijnen meestal binnen een paar dagen. Binnen een paar weken bent u minder moe. Door dit medicijn heeft u minder kans op schade door diabetes. Zoals wonden die slecht genezen, zenuwpijn, nierproblemen, hart- en vaatziekten en blind worden.

## Gebruik

Semaglutide is er als tabletten en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met semaglutide

- U gebruikt dit medicijn elke dag.
- Slik de tablet met een slok water. Doe dit op een **lege maag**, minimaal een half uur vóór u gaat ontbijten. Dan werkt dit medicijn het beste.


### Injecties met semaglutide

- U gebruikt dit medicijn 1 keer per week. Doe dat op een vaste dag en een vaste tijd. Dan vergeet u het minder snel.
- Spuit dit medicijn in uw buik, bovenbeen of bovenarm.

Uw arts of diabetesverpleegkundige legt u graag uit hoe u moet spuiten, en hoe u kunt meten hoeveel suiker er in uw bloed zit. U kunt ook de instructievideo van bloedsuiker meten bekijken op [Apotheek.nl](https://www.apotheek.nl).



Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van **te weinig suiker in het bloed (hypo)**. Dit gebeurt vaker als u semaglutide samen gebruikt met insuline of andere medicijnen die de bloedsuiker verlagen. Een hypo merkt u aan honger, hoofdpijn, moe voelen, duizelig zijn, een bleek gezicht, trillen, zweten en flauwvallen. Eet of drink bij een hypo snel iets met suiker, of druivensuiker.

Andere bijwerkingen van dit medicijn zijn:

- Misselijk voelen en overgeven
- Diarree

Deze klachten gaan meestal binnen 4 weken over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt. **Let op!** Door een hypo kunt u een ongeluk krijgen.

### Wat moet u doen als u wilt autorijden?

- Rijd alleen als u zich goed voelt.
- Meet voor het rijden uw bloedsuiker.
- Rijd alleen als u weet dat u een hypo kunt voelen aankomen.
- Overleg met uw arts of u veilig kunt autorijden.



**Let op!** Door alcohol kunt u een hypo krijgen. En uw lichaam voelt minder snel een hypo aankomen. Drink liever geen alcohol. Of drink minder dan 2 glazen per dag.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Ook tot en met 2 maanden nadat u bent gestopt met dit medicijn mag u niet zwanger worden.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.