

Samenvatting van solifenacine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Solifenacine ontspant de spieren van uw blaas. Hierdoor past er meer urine (plas) in uw blaas. U hoeft dan minder vaak te plassen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- urine-incontinentie, als u vaak aandrang heeft en steeds maar weinig plast.
- een vergrote prostaat, als u plasklachten heeft.

Zijn uw klachten na 4 weken niet minder? Ga dan naar uw arts.

Gebruik

Solifenacine is er als tabletten en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met solifenacine

Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Er zijn ook tabletten met gereguleerde afgifte. Slik deze heel door met water zonder te kauwen. Anders komt de dosis in één keer vrij.

Drank met solifenacine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een doseerspuit.
3. Spuit daarna de drank in uw mond.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig voelen
- suf of slaperig zijn
- wazig zien
- misselijk zijn. U heeft hier minder last van als u dit medicijn met wat voedsel neemt.
- buikpijn en verstopping. Bij verstopping helpt het om vezelrijke voeding te eten en veel vocht te drinken.
- een droge mond of keel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Rijd de eerste dagen **geen** auto. Daarna mag u alleen autorijden als u geen last heeft van duizelig voelen, suf of slaperig zijn en wazig zien.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

