

Samenvatting van spironolacton

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Spironolacton is een **plastablet**. Het verlaagt uw bloeddruk. Het zorgt ervoor dat u voldoende van het mineraal kalium in uw lichaam blijft houden. Ook zorgt het ervoor dat uw hart beter pompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- hartfalen
- oedeem (als uw lichaam te veel vocht vasthoudt)
- te weinig kalium in uw lichaam door andere plastabletten. Spironolacton maakt deze bijwerking weer goed.
- nierziekten
- veel haargroei op plekken waar u dit niet wilt

Bij hartfalen merkt u het effect binnen een paar weken. U merkt dan dat u langzaam minder benauwd bent en dat uw enkels minder dik zijn. Ook heeft u binnen een paar weken weer voldoende kalium in uw lichaam.

Bij veel haargroei merkt u binnen een paar maanden dat de haren minder groeien.

Gebruik

Spironolacton is er als tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met spironolacton

Neem de tabletten in met een half glas water.

Drank met spironolacton

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker, doseerspuit of maatlepel.
3. Drink deze hoeveelheid op..

Neem dit medicijn in met wat eten. Dan heeft u minder kans op klachten aan uw maag of darmen.

Uitleg van de apotheeker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

Mannen kunnen last krijgen van:

- roeiende borsten
- minder zin in vrijen
- geen stijve penis krijgen bij seksuele opwindning (impotentie)

Vrouwen kunnen last krijgen van:

- klachten rondom het ongesteld worden. Zoals hevige bloedingen of lang ongesteld blijven.
- pijn in de borsten.
- een lagere stem die niet meer over gaat.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Bel meteen uw arts als:

- u last krijgt van een lusteloos gevoel.
- uw hart anders klopt dan normaal. Dus te snel, of te langzaam, of niet regelmatig.

Deze klachten komen door te veel kalium in uw bloed. Uw arts zal de hoeveelheid kalium in uw bloed regelmatig controleren.

Waarschuwingen



Let op! Spironolacton en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met spironolacton.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.