

Samenvatting van **sumatriptan**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Sumatriptan stopt of vermindert migraine of clusterhoofdpijn. Het werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- migraine
- clusterhoofdpijn

De injectie werkt het snelst: binnen 10-15 minuten. De tabletten, smelttabletten, neusspray en zetpil werken na een half tot 1 uur

Gebruik

Sumatriptan is er als tablet, injectie, buisjes met neusspray en zetpil.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruik sumatriptan zodra u last krijgt van de eerste hoofdpijnklachten van migraine.

Helpt het medicijn goed maar komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u het nog een keer nemen. Er moet wel **2 uur of meer tussen de eerste en de tweede keer** zitten (voor injectie: 1 uur). Gebruik niet meer dan 3 tabletten per 24 uur. Gebruik niet meer dan 2 injecties, 2 buisjes (neusspray) of 2 zetpillen per 24 uur.

Tablet

Slik de tablet met een half glas water.

Gebruikt u de disperseerbare tablet? Slik de tablet met een beetje water. Heeft u moeite met slikken? Dan kunt u de tablet eerst oplossen in een beetje water. Dit smaakt bitter.

Injectie

Deze injectie zet u in uw bovenarm of bovenbeen. Uw arts legt uit hoe u moet spuiten. Kijk in de bijsluiter of op apotheek.nl hoe u de injectiepen moet gebruiken. Of vraag aan uw apotheek om uitleg.

Neusspray

1. Snuit uw neus.
2. Zit of sta rechtop en houd uw hoofd een beetje voorover.
3. Breng de tuit in één neusgat. Houd het andere neusgat dicht.
4. Druk het pompje stevig in, terwijl u door de neus inademt.
5. Adem 10-20 seconden lang in door uw neus en uit door uw mond. Zo blijft dit medicijn in uw neus.

Zetpil

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).
3. Duw met een vinger de zetpil helemaal naar binnen.

Gebruik sumatriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. Anders heeft u juist kans op extra hoofdpijn (medicijnafhankelijke hoofdpijn).

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- opvliegers of pijn en beklemd gevoel in borst of keel. Dit verdwijnt vanzelf binnen 2 uur. Gaat dit niet weg? Overleg dan met uw arts.
- slaperig, vermoeid en duizelig zijn
- bij injectie: pijn op de plek waar u heeft geprikt
- bij neusspray: bloedneus en bittere smaak. Deze bijwerkingen trekken snel weg.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag **4 uur niet rijden na dit medicijn.**

Daarna weer wel. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen, zoals duizelig, slaperig en vermoeid zijn.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.

Samenvatting van **sumatriptan**



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

