

Samenvatting van trimethoprim

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Trimethoprim is een antibioticum.
Het remt de groei van bacteriën.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij een blaasontsteking of om blaasontsteking te voorkomen. Dit medicijn werkt ook bij infecties van de luchtpijp en longen.

U heeft na een paar dagen minder last van de klachten.

Gebruik

Trimethoprim is er als tabletten en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Een kuur duurt meestal **3 tot 10 dagen**.

Gebruikt u trimethoprim eenmaal per dag voor blaasontsteking? Plas uw blaas leeg vlak voordat u gaat slapen en neem het daarna in. Het medicijn kan dan de hele nacht werken in de blaas.

Gebruikt u het vaker per dag? Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.

Tabletten met trimethoprim

Slik de tabletten met een half glas water.

Drank met trimethoprim

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbekertje of maatlepel.
3. Drink die hoeveelheid op.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Misselijk zijn en overgeven.
Heeft u hier last van? Neem het dan in met wat voedsel.
- Huiduitslag en jeuk

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Gebruikt u trimethoprim langer dan 2 weken? U heeft dan meer kans op bloedafwijkingen. Krijgt u last van koorts, keelpijn, blaren in uw mond of keel, bloedneuzen of bent u erg moe? Waarschuw dan uw arts.

Waarschuwingen



Let op! Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

