

Samenvatting van valsartan met sacubitril

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Valsartan met sacubitril maakt uw bloeddruk lager en zorgt dat uw hart het bloed beter rondpompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij hartfalen.

Dit medicijn gaat binnen 6 weken werken. U merkt dat u minder benauwd bent en dat uw enkels minder dik zijn. Ook bent u minder snel moe.

Gebruik

Valsartan met sacubitril is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Kies vaste tijdstippen, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt en in de avond bij het eten. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Tabletten

Slik de tabletten met een half glas water.

Korrels (granulaat) in de capsule in te openen

Strooi de inhoud van de capsule (kleine korreltjes) op zacht voedsel en eet dit direct op. De capsule mag **niet** heel worden ingeslikt.

Het is belangrijk dat u dit medicijn elke dag inneemt. Dan zal uw hart meer pompkracht behouden.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Duizelig worden bij het opstaan. Dat gebeurt vooral in de eerste paar weken. Sta daarom langzaam op uit bed of van een stoel. Ga even liggen als u zich duizelig voelt.
- Lusteloos zijn en hartritmestoornissen. Dit kan komen door teveel kalium in uw bloed.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Valsartan met sacubitril en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met Valsartan met sacubitril.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

