

Samenvatting van ketoconazol crème

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ketoconazol doodt schimmels en gisten.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidinfecties met schimmels of gisten:

- voetschimmel
- huidvlekjes (zomergist)
- seborroïsch eczeem

De jeuk, schilfers en rode huid worden binnen 2 tot 6 weken minder.

Bij voetschimmel gebruikt u dit medicijn 4 tot 6 weken. Bij seborroïsch eczeem gebruikt u dit medicijn 2 tot 4 weken. Bij zomergist gebruikt u dit medicijn meestal 2 weken.

Gebruik

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Schimmelinfecties en seborroïsch eczeem

1. Smeer ketoconazol crème. Doe dit 2 cm breder dan de ontstoken plek.
2. **Bedek de ingesmeerde plekken niet.** Doe er dus geen verband, pleister of een luier op.

Voetschimmel

1. Was de voeten en verwijder schilfers.
2. Smeer ketoconazol crème. Doe dit 2 cm breder dan de ontstoken plek

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- branderig gevoel
- irritatie van de huid

Deze bijwerkingen gaan snel over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Zorg dat dit medicijn niet in uw ogen, mond of neus komt. Want dan krijgt u daar last van bijwerkingen. Gebeurt dit toch? Spoel dan meteen goed met water.

Waarschuwingen



Let op!Maak de hele kuur af.

Ook als uw klachten verdwenen zijn.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Smeer het dan direct ná de borstvoeding op of rond uw tepel. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

