

Samenvatting van clomipramine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clomipramine zorgt ervoor dat u zich beter voelt en het maakt u minder angstig. Het zorgt er ook voor dat een man minder snel klaarkomt tijdens het vrijen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- angststoornissen, zoals dwangstoornis, paniekstoornis of angst voor bepaalde dingen of situaties (specifieke fobie)
- narcolepsie (slaapziekte)
- te snel klaarkomen (vroegtijdige zaadlozing)

U merkt niet direct dat u zich beter voelt. Dit duurt een paar weken. Zijn uw klachten niet minder geworden? Overleg dan met uw arts.

Gebruik

Clomipramine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een beetje water.

Let op! Gebruikt u de tablet met **vertraagde afgifte?**

Hier komt clomipramine langzaam uit vrij. De tabletten niet fijnmaken of kauwen. Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Heeft u moeite met slikken? Breek dan de tablet op de breukstreep. Slik daarna beide helften heel door.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- moe zijn
- onrust
- droge mond

Stop dan niet met dit medicijn. De bijwerkingen worden meestal binnen 2 weken minder of verdwijnen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Clomipramine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met clomipramine.



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Pas op met grapefruit of grapefruitsap als u clomipramine gebruikt. U heeft hierdoor namelijk meer kans op bijwerkingen.



Let op! Gebruikt u dit medicijn **elke dag?**

U mag de **eerste week** dat u dit medicijn gebruikt **niet autorijden**. Rijd ook geen auto als uw dosering omhoog gaat.

Let op! Gebruikt u dit medicijn **af en toe?** Dan mag u na iedere innname **24 uur geen auto rijden**. Daarna mag u alleen rijden als u geen last meer heeft van bijwerkingen.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

