

Samenvatting van 50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel

Waarom gebruikt u dit medicijn?

De 50-pil is een anticonceptiepil. De pil bevat de vrouwelijke hormonen ethinylestradiol en levonorgestrel.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- om zwangerschap te voorkomen
- bij menstruatieklasten
- om de menstruatie uit te stellen
- bij puistjes (acne)
- bij slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose)

Gebruik

De 50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel is er als tablet. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruikt u de pil om zwangerschap te voorkomen?

- Gebruikt u de pil voor het eerst? Begin dan op de eerste dag van uw menstruatie. U bent dan meteen beschermd tegen zwangerschap.
- **Let op!** Begint u niet op de eerste dag dat u ongesteld bent met de pil, maar een paar dagen later? De pil werkt dan pas ná 7 dagen. Gebruik daarom in de 1e week een extra vorm van anticonceptie. Bijvoorbeeld condooms.
- Gebruikte u vóór deze 50-pil eerst een andere pil? Of een andere vorm van anticonceptie? Meestal kunt u meteen overstappen op deze pil. Vraag uw apotheek om uitleg.
- **Let op!** Bent u een pil vergeten? Of heeft u binnen 4 uur na het innemen van de pil overgegeven of diarree gekregen? Dan werkt de pil mogelijk niet, of minder goed. U bent dan minder goed beschermd tegen zwangerschap. In de bijsluiter leest u wat u moet doen. Of vraag uw apotheek om advies.

Wilt u uw menstruatie uitstellen?

- Sla dan de stopweek over. U gaat direct verder met de volgende strip (op de dag dat de stopweek zou beginnen).
- Ga dan door met deze strip zolang u de menstruatie wilt uitstellen.
- U kunt de menstruatie maximaal 1 jaar uitstellen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- bloedverlies terwijl u niet ongesteld bent
- buikpijn
- misselijk voelen
- hoofdpijn
- stemmingsveranderingen

Veel bijwerkingen gaan binnen 3 maanden vanzelf weg. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheek of arts.

Waarschuwingen



Let op! De 50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheek controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met de 50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Bent u zwanger? En heeft u per ongeluk toch de pil ingenomen in de eerste weken van uw zwangerschap? Dit is niet slecht voor uw baby. Stop met deze pil wanneer u erachter komt dat u zwanger bent.



Let op! Geeft u borstvoeding? Vanaf 6 weken na de bevalling kunt u de pil veilig gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. Tot **6 weken na de bevalling** kunt u de pil beter **NIET gebruiken**.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

