

Samenvatting van **acetazolamide**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Acetazolamide zorgt ervoor dat u minder vocht binnen het oog aanmaakt. Het zorgt er ook voor dat u meer vocht uitplast.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- glaucoom (verhoogde oogboldruk)
- oedeem (als uw lichaam teveel vocht vasthoudt)
- epilepsie
- hoogteziekte

Gebruik

Acetazolamide is er als tabletten en als drank. Er zijn ook injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Tabletten met acetazolamide

Slik de tabletten met een half glas water.

Drank met acetazolamide

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een doseerspuitje of maatbeker.
3. Drink deze hoeveelheid op.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, moe en duizelig gevoel
- dorst en vaker moeten plassen
- maagdarmklachten. Zoals misselijk zijn, diarree, overgeven en buikpijn. Gaat dit niet over? Raadpleeg dan meteen uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! U mag 1 week niet autorijden als u met dit medicijn begint. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

