

# Samenvatting van **acetylcysteïne**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Acetylcysteïne verdunt taai slijm in de longen. U kunt het daardoor makkelijker ophoesten.

Acetylcysteïne werkt bij:

- Slijmhoest. Zoals bij de longziekte astma.
- 'Complex regionaal pijnsyndroom'. Dat is blijvende pijn, veranderende huid en een warme of koude huid na een ernstige verwonding.

Bij slijmhoest wordt het slijm na ongeveer 2 uur losser.

## Gebruik

Acetylcysteïne is er als tabletten, zuigtabletten, bruistabletten, poeder, granulaat (korrels) en drank.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met acetylcysteïne

Slik de tabletten met een half glas water.

### Zuigtabletten met acetylcysteïne

Laat de tablet in uw mond smelten en slik daarna door.

### Bruistabletten en poeder met acetylcysteïne

1. Doe de bruistabletten of het poeder in een glas water.
2. Roer goed en drink het op.  
**Let op!** Los dit medicijn niet op in melk of een andere drank. Want dan werkt het minder goed.

### Granulaat in zakjes met acetylcysteïne

1. Doe de korrels in een half glas water.
2. Roer goed en drink het op.

### Drank met acetylcysteïne

1. Schud de drank goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af in het maatbekertje en drink op.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van maagdarmklachten. Zoals misselijk zijn en buikpijn.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

