

Samenvatting van Acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Acetylsalicylzuur zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert (antistollingsmedicijn). Hierdoor heeft u minder kans op trombose (bloedstolsel).

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- om trombose te voorkomen.
Bijvoorbeeld na een hartinfarct, een beroerte (herseninfarct of TIA), bij angina pectoris (hartkramp) en bepaalde hartritmestoornissen.
- bij bepaalde bloedziekten

Gebruik

Acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel is er als tabletten.

Let op! Acetylsalicylzuur is er ook voor pijn en ontstekingen. Daar zijn andere aanwijzingen en waarschuwingen voor. Deze tekst gaat alleen over acetylsalicylzuur als antistollingsmedicijn.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gewone tabletten met acetylsalicylzuur

1. Zit of sta rechtop.
2. Slik de tabletten met een glas water.

Let op! Gebruikt u de maagsapresistente tabletten (MSR)? U mag deze tabletten niet **fijnmaken of kauwen**. Anders komt dit medicijn in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Oplostabletten met acetylsalicylzuur

Doe de tablet in een half glas water.
Roer en drink op.

Slik dit medicijn elke dag. Dan heeft u minder kans op (nog) een hartinfarct of beroerte.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen:

- darmklachten. Zoals maagpijn en brandend maagzuur.
Heeft u last van uw maag? Slik dit medicijn dan met wat eten.
- bloedingen.
U krijgt dan sneller blauwe plekken of een bloeding in uw lichaam.

Let op! Krijgt u grote blauwe plekken, bloed in uw poep of plas of ineens zware hoofdpijn? Waarschuw dan **meteen** uw arts.

Waarschuwingen



Let op! Acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel..



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



14-2-2022