

# Samenvatting van aciclovir om in te nemen

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Aciclovir remt de groei van bepaalde soorten virussen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij virusinfecties, zoals:

- herpes genitalis (een geslachtsziekte)
- gordelroos (herpes-zoster-virus)
- koortslip (herpes-simplex-virus)
- waterpokken bij volwassenen

Ook schrijft de arts dit medicijn voor om virusinfecties te voorkomen bij mensen met een lage weerstand. Bijvoorbeeld na orgaantransplantaties.

## Gebruik

Aciclovir om in te nemen is er als tabletten en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met aciclovir

Slik de tabletten met een half glas water.

### Drank met aciclovir

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met het maatlepeltje.
3. Drink die hoeveelheid op. Of doe het in een glas (zoete) drank en drink het op.

**Let op!** Verdeel dit medicijn zo goed mogelijk over de dag. Meestal moet u dit medicijn elke 4 uur nemen. In de nacht neemt u 1 dosis voor u gaat slapen. Neem de volgende dosis nadat u opstaat in de ochtend.

Een **kuur** met dit medicijn duurt meestal tussen de **2 en 10 dagen**.

**Let op!** Heeft u **vaker dan 6 keer per jaar herpes genitalis**? Dan kan uw arts dit medicijn voorschrijven om het te voorkomen. U moet het dan **meerdere maanden** gebruiken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten van de maag en darmen, zoals misselijk zijn, overgeven en diarree
- hoofdpijn
- duizelig zijn
- moe zijn
- koorts
- jeuk en huiduitslag
- gevoeligheid van de huid voor UV licht

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

