

Samenvatting van proguanil met atovaquon

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Atovaquon en proguanil doden de malariaparasiet.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij malaria en om malaria te voorkomen

Gebruik

Atovaquon met proguanil is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water bij een warme maaltijd of met een zuiveldrink. Het medicijn wordt dan beter opgenomen en u wordt minder snel misselijk.

Neem dit medicijn steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Hoelang?

- Voorkomen van malaria: begin met dit medicijn 1 dag voordat u in het malariagebied aankomt. Neem het daarna 1 keer per dag zolang u in het malariagebied bent. Na vertrek uit het malariagebied blijft u het nog 7 dagen slikken.
- **Behandelen van malaria:** u gebruikt dit medicijn 3 dagen lang in een hoge dosis.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn, diarree en buikpijn
- hoofdpijn en duizeligheid
- minder eetlust
- slechter kunnen slapen
- klachten van depressie

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog parasieten over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

