

# Samenvatting van bumetanide

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Bumetanide is een plastablet. Het zorgt dat u onnodig vocht uitplast. Hierdoor kan uw hart beter pompen. En het beschermt uw nieren.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hartfalen (uw hart pompt het bloed minder goed rond)
- oedeem (uw lichaam houdt te veel vocht vast)
- nierziekten

U moet door dit medicijn meer plassen. Meestal een half uur tot ongeveer 6 uur nadat u dit medicijn heeft ingenomen. Binnen een paar dagen bent u minder benauwd en heeft u minder dikke enkels.

## Gebruik

Bumetanide is er als tabletten. Dit medicijn is er ook als injectie. Deze tekst gaat alleen over de tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

**Slik dit medicijn elke dag.** Dan blijft uw hart het bloed beter rondpompen. U bent dan minder snel moe en benauwd.

Moet u veel plassen op onhandige momenten? Dan kunt u dit medicijn op een ander moment slikken. Neem het **niet later dan 18.00 uur**. Anders moet u in de nacht vaak opstaan om te plassen

## Bijwerkingen

U kunt de eerste dagen hoofdpijn krijgen of duizelig worden. Bent u duizelig? Sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** bumetanide en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met bumetanide.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

