

Samenvatting van **candesartan**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Candesartan verlaagt uw bloeddruk. Ook zorgt het ervoor dat uw hart het bloed beter rond pompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij hoge bloeddruk
- bij hartfalen
- om migraine te voorkomen

Uw **bloeddruk** wordt lager binnen 6 weken.

Bij **hartfalen** krijgt u minder last van een benauwd gevoel en dikke enkels.

Bij **migraine** kan het effect bepaald worden als u dit medicijn 3 maanden heeft gebruikt.

Gebruik

Candesartan is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een glas water..

Slik dit medicijn elke dag. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt duizelig worden. Slik candesartan de eerste dagen in de avond als u op uw bed zit. Dan kunt u gaan liggen als u duizelig wordt.

Heeft u veel last van deze bijwerking? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Candesartan en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met candesartan.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

