

# Samenvatting van claritromycine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Claritromycine is een antibioticum.  
Het werkt tegen infecties met bacteriën.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- infecties aan de luchtwegen, zoals longen, keel of bijholten (de holten in uw wangen, links en rechts naast uw neus)
- cystische fibrose (taaislijmziekte)
- legionella (veteranenziekte)
- huidinfecties
- maagzweren of darmzweren
- ontsteking van de eikel

U heeft na een paar dagen minder last van de klachten.

## Gebruik

Claritromycine is er als tabletten, tabletten met vertraagde afgifte en drank.  
Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met claritromycine

Slik de tablet met een half glas water.

### Tabletten met een vertraagde afgifte

Deze tabletten **heel doorslikken**.

**Let op!** U mag ze **niet fijnmaken of erop kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij.

### Drank met claritromycine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met de doseerpipet of maatlepel.
3. De drank smaakt bitter.  
Drink daarom nog een extra glas water.

De kuur duurt meestal 5 tot 14 dagen.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- tijdelijk een andere smaak en reuk
- misselijk voelen
- buikpijn
- maagkrampen
- diarree. **Let op!** Waarschuw uw arts bij ernstige diarree.
- huiduitslag
- meer zweten dan normaal
- ontstoken slijmvliezen van de mond, keel of vagina.  
**Let op!** Ziet u een wit beslag in uw mond of krijgt u witte vloed uit uw vagina? Raadpleeg dan uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

