

# Samenvatting van clindamycine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clindamycine is een antibioticum.

Het werkt tegen infecties met bacteriën en parasieten (heel kleine beestjes).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties met bacteriën van:

- de longen of luchtpijp
- de bijholten (de holten in uw wangen, links en rechts naast uw neus)
- de huid
- de vagina

Clindamycine werkt ook bij infecties door parasieten, zoals:

- toxoplasmose
- malaria

U heeft na een paar dagen minder last van de klachten.

## Gebruik

Clindamycine is er als drank en capsules. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als injectie of infuus. Deze tekst gaat alleen over de drank en capsules.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Drank met clindamycine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of maatlepel.
3. Drink die hoeveelheid op.

### Capsules met clindamycine

Slik de capsules met een heel glas water. Doe dit terwijl u staat of rechtop zit.

Hierdoor irriteren de capsules niet uw mond of slokdarm.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- diarree
- buikpijn

Deze bijwerkingen gaan over als u dit medicijn langer gebruikt of nadat de kuur klaar is.

**Let op!** Bel uw arts **meteen** als u last krijgt van:

- ernstige diarree met kramp in de buik
- meer keren per dag diarree met overgeven en koorts
- allergie.

Dit merkt u aan blaren op uw huid, benauwdheid, een opgezwollen gezicht en flauwvallen. Stop dan met dit medicijn.

**Let op!** Bent u allergisch voor clindamycine? Meld dit dan bij uw apotheek.

## Waarschuwingen



**Let op!** Maak de hele kuur af. Oók als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën of parasieten.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

